

La integral de Lebesgue de funciones complejas (un tema de análisis real)

Egor Maximenko

<http://www.egormaximenko.com>

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Física y Matemáticas, México

19 de junio de 2024

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria
- 3 Definición de la integral de funciones complejas
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria
- 3 Definición de la integral de funciones complejas
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

Objetivos de esta clase:

- definir la integral de Lebesgue de funciones complejas;
- estudiar sus propiedades elementales.

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

- $\int_X f d\mu$ para $f \in \mathcal{SM}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty))$,

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

- $\int_X^{(1)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{SM}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty))$,
- $\int_X^{(2)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$,

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

- $\int_X^{(1)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{SM}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty))$,
- $\int_X^{(2)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$,
- $\int_X^{(3)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R})$ con $\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty$,

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

- $\int_X^{(1)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{SM}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty))$,
- $\int_X^{(2)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$,
- $\int_X^{(3)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R})$ con $\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty$,
- $\int_X^{(4)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C})$ con $\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty$.

Etapas de la definición de la integral de Lebesgue

- $\int_X^{(1)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{SM}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty))$,
- $\int_X^{(2)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$,
- $\int_X^{(3)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R})$ con $\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty$,
- $\int_X^{(4)} f \, d\mu$ para $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C})$ con $\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty$.

En esta clase explicamos rápidamente la etapa 4.

Prerrequisitos:

- la integral de Lebesgue de funciones positivas medibles, la denotamos por $\int^{(2)}$;
- la propiedad monótona de la integral $\int^{(2)}$;
- la integral de Lebesgue de funciones reales medibles, la denotamos por $\int^{(3)}$;
- las propiedades lineales de la integral $\int^{(3)}$;
- la propiedad monótona de la integral $\int^{(3)}$;
- la parte real e imaginaria de un número complejo;
- el valor absoluto de un número complejo.

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria**
- 3 Definición de la integral de funciones complejas
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

La parte real e imaginaria de números complejos, repaso

Para z en \mathbb{C} , si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$\operatorname{Re}(z) =$$

La parte real e imaginaria de números complejos, repaso

Para z en \mathbb{C} , si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$\operatorname{Re}(z) = x,$$

La parte real e imaginaria de números complejos, repaso

Para z en \mathbb{C} , si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$\operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) =$$

La parte real e imaginaria de números complejos, repaso

Para z en \mathbb{C} , si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$\operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) = y.$$

La parte real e imaginaria de números complejos, repaso

Para z en \mathbb{C} , si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, entonces

$$\operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) = y.$$

Las funciones $\operatorname{Re}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, $\operatorname{Im}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas.

El valor absoluto de números complejos

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$, entonces

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El valor absoluto de números complejos

Si $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$, entonces

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Sabemos que

$$|z|^2 = z\bar{z}, \quad |z + w| \leq |z| + |w|.$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x|$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| =$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} =$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Por otro lado, usamos la propiedad subaditiva de abs en \mathbb{C} :

$$|z| = |x + iy|$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Por otro lado, usamos la propiedad subaditiva de abs en \mathbb{C} :

$$|z| = |x + iy| \leq$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Por otro lado, usamos la propiedad subaditiva de abs en \mathbb{C} :

$$|z| = |x + iy| \leq |x| + |iy|$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Por otro lado, usamos la propiedad subaditiva de abs en \mathbb{C} :

$$|z| = |x + iy| \leq |x| + |iy| =$$

Cotas para $|z|$, $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$

Proposición

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $z = x + iy$. Entonces,

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|.$$

Demostración.

$$|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|,$$

Por otro lado, usamos la propiedad subaditiva de abs en \mathbb{C} :

$$|z| = |x + iy| \leq |x| + |iy| = |x| + |y|.$$

La parte real y la parte imaginaria de una función

Sea $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Definimos

$$\operatorname{Re}(f): X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \operatorname{Im}(f): X \rightarrow \mathbb{R}, \quad |f|: X \rightarrow [0, +\infty),$$

$$\operatorname{Re}(f) := \operatorname{Re} \circ f, \quad \operatorname{Im}(f) := \operatorname{Im} \circ f, \quad |f| := \operatorname{abs} \circ f.$$

En otras palabras, para cada x en X ,

$$\operatorname{Re}(f)(x) := \operatorname{Re}(f(x)), \quad \operatorname{Im}(f)(x) := \operatorname{Im}(f(x)), \quad |f|(x) := |f(x)|.$$

Cotas para $|\operatorname{Re}(f)|$, $|\operatorname{Im}(f)|$ y $|f|$

Ejercicios. Sea $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Demostrar que

$$|\operatorname{Re}(f)| \leq |f|, \quad |\operatorname{Im}(f)| \leq |f|, \quad |f| \leq |\operatorname{Re}(f)| + |\operatorname{Im}(f)|.$$

Todas estas desigualdades se entienden como comparaciones punto a punto.

La medibilidad de la parte real e imaginaria de una función medible

Proposición

Sea (X, \mathcal{F}) un espacio medible y sea $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces

$$f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C}) \iff \operatorname{Re}(f) \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R}) \wedge \operatorname{Im}(f) \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R}).$$

Ejercicio: recordar una demostración.

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria
- 3 Definición de la integral de funciones complejas**
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

Notación para la integral de funciones medibles positivas

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

Notación para la integral de funciones medibles positivas

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

Dada f en $\mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$, denotamos su integral de Lebesgue por $\int_X^{(2)} f \, d\mu$.

Notación para la integral de funciones medibles positivas

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

Dada f en $\mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty])$, denotamos su integral de Lebesgue por $\int_X^{(2)} f \, d\mu$.

Pongamos

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, [0, +\infty]) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, [0, +\infty]) : \int_X^{(2)} f \, d\mu < +\infty \right\}.$$

Notación para la integral de funciones medibles reales

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R}) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{R}) : \int_X^{(2)} |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Dada f en $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R})$, denotamos su integral de Lebesgue por $\int_X^{(3)} f d\mu$.

Relaciones entre la integrabilidad de $\operatorname{Re}(f)$, $\operatorname{Im}(f)$ y $|f|$

Proposición

Sea $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C})$. Entonces,

$$\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty \iff \int_X^{(2)} |\operatorname{Re}(f)| \, d\mu < +\infty \quad \wedge \quad \int_X^{(2)} |\operatorname{Im}(f)| \, d\mu < +\infty.$$

Relaciones entre la integrabilidad de $\operatorname{Re}(f)$, $\operatorname{Im}(f)$ y $|f|$

Proposición

Sea $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C})$. Entonces,

$$\int_X^{(2)} |f| \, d\mu < +\infty \iff \int_X^{(2)} |\operatorname{Re}(f)| \, d\mu < +\infty \quad \wedge \quad \int_X^{(2)} |\operatorname{Im}(f)| \, d\mu < +\infty.$$

Demostración. Usar las fórmulas

$$|f| \leq |\operatorname{Re}(f)| + |\operatorname{Im}(f)|, \quad |\operatorname{Re}(f)| \leq |f|, \quad |\operatorname{Im}(f)| \leq |f|,$$

la propiedad monótona de $\int^{(2)}$ y la propiedad aditiva de $\int^{(2)}$.

Funciones complejas integrables, la integral para funciones complejas

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C}) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C}) : \int_X^{(2)} |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Funciones complejas integrables, la integral para funciones complejas

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C}) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C}) : \int_X^{(2)} |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida. Para cada f en $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$,

$$\int_X^{(4)} f d\mu$$

Funciones complejas integrables, la integral para funciones complejas

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C}) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C}) : \int_X^{(2)} |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida. Para cada f en $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$,

$$\int_X^{(4)} f d\mu :=$$

Funciones complejas integrables, la integral para funciones complejas

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida.

$$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C}) := \left\{ f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, \mathbb{C}) : \int_X^{(2)} |f| d\mu < +\infty \right\}.$$

Definición

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida. Para cada f en $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$,

$$\int_X^{(4)} f d\mu := \int_X^{(3)} \operatorname{Re}(f) d\mu + i \int_X^{(3)} \operatorname{Im}(f) d\mu.$$

Proposición

Sea $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$ si, y solo si,

$$\operatorname{Re}(f) \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R}) \quad \wedge \quad \operatorname{Im}(f) \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R}).$$

$\int^{(4)} = \int^{(3)}$ para funciones reales medibles integrables

Proposición

Sea $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R})$. Entonces

$$\int_X^{(4)} f \, d\mu = \int_X^{(3)} f \, d\mu.$$

$\int^{(4)} = \int^{(3)}$ para funciones reales medibles integrables

Proposición

Sea $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{R})$. Entonces

$$\int_X^{(4)} f \, d\mu = \int_X^{(3)} f \, d\mu.$$

Demostración.

$$\operatorname{Re}(f) = f, \quad \operatorname{Im}(f) = 0_X.$$

Proposición (un subespacio de un espacio de medida, repaso)

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida, y sea $A \in \mathcal{F}$. Definimos

$$\mathcal{F}_A := \{B \in \mathcal{F} : B \subseteq A\}, \quad \mu_A := \mu|_{\mathcal{F}_A}.$$

Entonces, $(A, \mathcal{F}_A, \mu_A)$ es un espacio de medida.

Proposición (un subespacio de un espacio de medida, repaso)

Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida, y sea $A \in \mathcal{F}$. Definimos

$$\mathcal{F}_A := \{B \in \mathcal{F} : B \subseteq A\}, \quad \mu_A := \mu|_{\mathcal{F}_A}.$$

Entonces, $(A, \mathcal{F}_A, \mu_A)$ es un espacio de medida.

Proposición (sobre la medibilidad de la función restringida, repaso)

Sean (X, \mathcal{F}) , (Y, \mathcal{H}) espacios medibles, $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{F}, Y, \mathcal{H})$, $A \in \mathcal{F}$. Entonces,

$$f|_A \in \mathcal{M}(A, \mathcal{F}_A, Y, \mathcal{H}).$$

Integración de funciones complejas sobre un subconjunto

Definición

Sean (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida, $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$, $A \in \mathcal{F}$.

$$\int_A^{(4)} f \, d\mu := \int_A^{(4)} f|_A \, d\mu_A.$$

Integración de funciones complejas sobre un subconjunto

Definición

Sean (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida, $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$, $A \in \mathcal{F}$.

$$\int_A^{(4)} f \, d\mu := \int_A^{(4)} f|_A \, d\mu_A.$$

Ejercicio. Demostrar que

$$\int_A^{(4)} f \, d\mu = \int_A^{(3)} \operatorname{Re}(f) \, d\mu + i \int_A^{(3)} \operatorname{Im}(f) \, d\mu, \quad \int_A^{(4)} f \, d\mu = \int_X^{(4)} \mathbb{1}_A f \, d\mu.$$

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria
- 3 Definición de la integral de funciones complejas
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

La parte real, la parte imaginaria y operaciones con números complejos

Ejercicio. Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Expresar

$$\operatorname{Re}(z + w), \quad \operatorname{Im}(z + w), \quad \operatorname{Re}(z w), \quad \operatorname{Im}(z w)$$

en términos de $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$, $\operatorname{Re}(w)$, $\operatorname{Im}(w)$.

La parte real, la parte imaginaria y operaciones con números complejos

Ejercicio. Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Expresar

$$\operatorname{Re}(z + w), \quad \operatorname{Im}(z + w), \quad \operatorname{Re}(z w), \quad \operatorname{Im}(z w)$$

en términos de $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$, $\operatorname{Re}(w)$, $\operatorname{Im}(w)$.

Ejercicio. Sean $f, g: X \rightarrow \mathbb{C}$. Expresar

$$\operatorname{Re}(f + g), \quad \operatorname{Im}(f + g), \quad \operatorname{Re}(f g), \quad \operatorname{Im}(f g)$$

en términos de $\operatorname{Re}(f)$, $\operatorname{Im}(f)$, $\operatorname{Re}(g)$, $\operatorname{Im}(g)$.

Las propiedades lineales de $\int^{(4)}$

Usando los ejercicios anteriores, demostrar las siguientes propiedades.

Proposición

Sean $f, g \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$, $\alpha \in \mathbb{C}$. Entonces

$$\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu, \quad \int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

Plan

- 1 Introducción
- 2 La parte real e imaginaria
- 3 Definición de la integral de funciones complejas
- 4 Propiedades lineales
- 5 El valor absoluto de la integral

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$.

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$\operatorname{Re}(f)(x)$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x),$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x)$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x),$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1,$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu = 1 + i,$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu = 1 + i, \quad \int_X |f| \, d\mu$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu = 1 + i, \quad \int_X |f| \, d\mu =$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{sen}(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu = 1 + i, \quad \int_X |f| \, d\mu = \frac{\pi}{2}.$$

Ejemplo

$X = [0, \pi/2]$ con la medida de Lebesgue, $f(x) := e^{ix}$. Entonces,

$$\operatorname{Re}(f)(x) = \cos(x), \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \sin(x), \quad \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu = 1, \quad \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu = 1,$$

$$\int_X f \, d\mu = 1 + i, \quad \int_X |f| \, d\mu = \frac{\pi}{2}.$$

Notamos que en este ejemplo

$$\underbrace{\left| \int_X f \, d\mu \right|}_{\sqrt{2}} < \underbrace{\int_X |f| \, d\mu}_{\frac{\pi}{2}} < \underbrace{\left| \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu \right| + \left| \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu \right|}_2.$$

Una rotación que convierte un número complejo en un número positivo

Ejercicio. Sea $z \in \mathbb{C}$. Construir $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que

$$|\alpha| = 1, \quad \alpha z = |z|.$$

Una rotación que convierte un número complejo en un número positivo

Ejercicio. Sea $z \in \mathbb{C}$. Construir $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que

$$|\alpha| = 1, \quad \alpha z = |z|.$$

El caso $z = 0$ es trivial. En este caso sirve, por ejemplo, $\alpha = 1$.

Una rotación que convierte un número complejo en un número positivo

Ejercicio. Sea $z \in \mathbb{C}$. Construir $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que

$$|\alpha| = 1, \quad \alpha z = |z|.$$

El caso $z = 0$ es trivial. En este caso sirve, por ejemplo, $\alpha = 1$.

En el caso $z \neq 0$, hay al menos tres caminos.

- Construir α en términos de \bar{z} y $|z|$,
- Si $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, expresar α a través de x, y .
- Si $z = \rho e^{i\theta}$ con $\rho > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$, expresar α a través de ρ, θ .

Comparación de $\text{abs}(\int f)$ con $\int \text{abs}(f)$

Teorema

Sea $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{F}, \mu, \mathbb{C})$. Entonces,

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu.$$

Un camino falso de demostración

Es correcta la siguiente cota:

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \left| \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu \right| + \left| \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu \right|,$$

pero no sirve para demostrar el teorema.

Un camino falso de demostración

Es correcta la siguiente cota:

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \left| \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu \right| + \left| \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu \right|,$$

pero no sirve para demostrar el teorema.

En efecto, ya vimos un ejemplo con

$$\left| \int_X \operatorname{Re}(f) \, d\mu \right| + \left| \int_X \operatorname{Im}(f) \, d\mu \right| > \int_X |f| \, d\mu.$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$.

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f)$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)|$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f|$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f|$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z|$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| = \alpha z$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| = \alpha z \underline{\underline{\alpha z \geq 0}}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z)$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) =$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right)$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \end{aligned}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_X \alpha f \, d\mu \right) \end{aligned}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_X \alpha f \, d\mu \right) = \end{aligned}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_X \alpha f \, d\mu \right) = \int_X u \, d\mu \end{aligned}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_X \alpha f \, d\mu \right) = \int_X u \, d\mu \leq \end{aligned}$$

Demostración

$$z := \int_X f \, d\mu.$$

Encontramos $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $|\alpha| = 1$ y $\alpha z = |z|$. Pongamos $u := \operatorname{Re}(\alpha f)$.

$$u = \operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq |\alpha f| = |\alpha| |f| = |f|.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_X f \, d\mu \right| &= |z| = \alpha z \stackrel{\alpha z \geq 0}{=} \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re} \left(\alpha \int_X f \, d\mu \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_X \alpha f \, d\mu \right) = \int_X u \, d\mu \leq \int_X |f| \, d\mu. \end{aligned}$$