

Topología del eje real

Objetivos. Demostrar que todo subconjunto abierto del eje real es una unión finita o numerable de intervalos abiertos disjuntos.

Requisitos. Espacio métrico, intervalos del eje real.

1. Definición (topología del eje real). El eje real \mathbb{R} se considera con la topología $\tau_{\mathbb{R}}$ generada por la métrica canónica $d(x, y) := |x - y|$. En otras palabras,

$$\tau_{\mathbb{R}} := \{A \subset \mathbb{R} : \forall x \in A \quad \exists r > 0 \quad (x - r, x + r) \subset A\}.$$

2. Plan. Vamos a demostrar que todo subconjunto abierto de \mathbb{R} es una unión finita o numerable de intervalos abiertos disjuntos. Dado un conjunto abierto, primero definimos una relación de equivalencia: decimos que dos puntos $x, y \in A$ son equivalentes si estos puntos se pueden unir con un intervalo contenido en A . Luego mostramos que cada clase de equivalencia (es decir, cada componente arco-conexa) es un intervalo abierto. Al final mostramos que el conjunto de las clases de equivalencia es finito o numerable.

3. Tarea adicional: subconjuntos conexos del eje real. Demostrar que en \mathbb{R} todo conjunto abierto conexo es un intervalo, y por consecuencia es convexo y arco-conexo. En estos apuntes no trabajamos con estos conceptos generales y elegimos un camino más elemental. En vez de hablar de caminos arbitrarios entre dos puntos x, y , consideramos el intervalo cerrado que los une. Si $x \leq y$, es $[x, y]$; si $y \leq x$, es $[y, x]$. Para abarcar ambos casos, escribimos $[x, y] \cup [y, x]$. Es lo mismo que la envoltura convexa del conjunto $\{x, y\}$.

4. Lema. Sea $A \in \tau_{\mathbb{R}}$. Definimos una relación binaria $\overset{A}{\sim}$ en A de la siguiente manera:

$$x \overset{A}{\sim} y \quad \stackrel{\text{def}}{\iff} \quad [x, y] \cup [y, x] \subset A.$$

Entonces $\overset{A}{\sim}$ es una relación de equivalencia en A .

Demostración. 1. Propiedad reflexiva. Para cualquier $x \in A$ tenemos $[x, x] = \{x\} \subset A$.

2. Propiedad simétrica es obvia porque los puntos x, y hacen papeles iguales en la definición (más formalmente, se usa la propiedad conmutativa de la operación \cup).

3. Propiedad transitiva. Sean $x, y, z \in A$ tales que $x \overset{A}{\sim} y, y \overset{A}{\sim} z$. Sin pérdida de generalidad consideremos el caso $x < z$. Entonces $[z, x] = \emptyset \subset A$. Demostremos la contención $[x, z] \subset A$. Dependiendo de la posición del punto y tenemos tres casos:

I. $x \leq y \leq z$. En este caso $[x, z] = [x, y] \cup [y, z] \subset A$.

II. $y < x$. En este caso $[x, z] \subset [y, z] \subset A$.

III. $z < y$. En este caso $[x, z] \subset [x, y] \subset A$. □

5. Lema. Sea $A \in \tau_{\mathbb{R}}$ y sea $x \in A$. Denotemos por $[x]_A$ la clase de equivalencia de x respecto a la relación binaria $\overset{A}{\sim}$:

$$[x]_A := \{y \in A: x \overset{A}{\sim} y\}.$$

Además pongamos

$$\alpha_x := \inf[x]_A, \quad \beta_x := \sup[x]_A.$$

Entonces

$$[x]_A = (\alpha_x, \beta_x).$$

Demostración. 1. Demostremos que $x \in (\alpha_x, \beta_x)$. Como A es abierto, existe un $r > 0$ tal que $(x - r, x + r) \subset A$. Obviamente, para cada $y \in (x - r, x + r)$ tenemos que

$$[x, y] \subset (x - r, x + r) \subset A, \quad [y, x] \subset (x - r, x + r) \subset A,$$

así que $(x - r, x + r) \subset [x]_A$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \alpha_x &= \inf[x]_A \leq \inf(x - r, x + r) = x - r < x, \\ \beta_x &= \sup[x]_A \geq \sup(x - r, x + r) = x + r > x. \end{aligned}$$

2. Demostremos que $[x]_A \subset (\alpha_x, \beta_x)$. Sea $y \in [x]_A$. Entonces $[y]_A = [x]_A$ y por lo tanto $\alpha_y = \alpha_x$, $\beta_y = \beta_x$. Aplicando el resultado del inciso 1 al punto y en vez del punto x , obtenemos $y \in (\alpha_y, \beta_y)$, pero el último intervalo coincide con (α_x, β_x) .

3. Demostremos que $(\alpha_x, \beta_x) \subset [x]_A$. Sea $y \in (\alpha_x, \beta_x)$. Si $y = x$, entonces por supuesto $y \in [x]_A$. Consideremos el caso $y < x$ (el caso $y > x$ se considera de manera similar). La desigualdad $\alpha_x < y$ y la definición de \inf implican que existe un punto $a \in [x]_A$ tal que $a < y$. Por tanto $[y, x] \cup [x, y] = [y, x] \subset [a, x] \subset A$, así que $y \in [x]_A$. \square

6. Ejercicio. En las condiciones del lema anterior, demostrar que $\alpha_x, \beta_x \notin A$.

7. Teorema. Cualquier conjunto abierto en el eje real es una unión finita o numerable de intervalos abiertos disjuntos.

Demostración. Sea $A \in \tau_{\mathbb{R}}$ y sea $P = \{(\alpha_x, \beta_x): x \in A\}$. Para cualquier $V \in P$ tenemos que $V \subset A$, así que $\bigcup_{V \in P} V \subset A$. Por otro lado, si $x \in A$, entonces $x \in (\alpha_x, \beta_x) \in P$ y por lo tanto $x \in \bigcup_{V \in P} V$. Acabamos de demostrar que

$$A = \bigcup_{V \in P} V.$$

Se sabe que el conjunto \mathbb{Q} es numerable y cualquier intervalo abierto en \mathbb{R} intersecta con \mathbb{Q} . El mapeo $f: A \cap \mathbb{Q} \rightarrow P$ definido mediante la regla $f(q) := (\alpha_q, \beta_q)$ es suprayectivo, por lo tanto P es finito o numerable. \square