

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante α .

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

La biyección canónica entre el eje real extendido y una semicircunferencia. Denotemos por Y la semicircunferencia inferior con centro $(0, 1)$ de radio 1 en \mathbb{R}^2 :

$$Y := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 = 1, \quad y \leq 1 \right\}.$$

Definimos $f: [-\infty, \infty] \rightarrow Y$ mediante las siguientes reglas.

- Si $t \in \mathbb{R}$, entonces $f(t)$ es el punto de intersección de Y con el segmento que une los puntos $(t, 0)$ y $(0, 1)$.
- Si $t = -\infty$, entonces $f(t) = (-1, 1)$.
- Si $t = +\infty$, entonces $f(t) = (1, 1)$.

Calcular $f(t)$ de manera explícita para $t \in \mathbb{R}$ y demostrar que f es continua.

Ejercicio 2. 5 %.

La cerradura de la bola abierta está contenida en la bola cerrada. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $a \in X$, $r > 0$. Demostrar que

$$\text{cl}(B(a, r)) \subseteq C(a, r),$$

donde $C(a, r) := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}$.

Ejercicio 3. 6 %.

La cerradura de una bola abierta puede ser un subconjunto propio de la bola cerrada. Consideramos el espacio $X = \mathbb{Z}$ con la distancia canónica $d(x, y) := |x - y|$. Encontrar $a \in X$ y $r > 0$ tales que

$$\text{cl}(B(a, r)) \subsetneq \{x \in X : d(x, a) \leq r\}.$$

Ejercicio 4. 5 %.

Las bolas abiertas son abiertas. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por τ_d la topología inducida por d . Sean $a \in X$, $r > 0$. Demostrar que $B(a, r) \in \tau_d$.

Ejercicio 5. 5 %.

La distancia entre el punto variable y el conjunto fijo es una función Lipschitz continua con coeficiente 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subseteq X$, $A \neq \emptyset$. Definimos $D_A: X \rightarrow [0, +\infty)$,

$$D_A(x) := \inf_{a \in A} d(x, a).$$

Demostrar que $|D_A(x) - D_A(y)| \leq d(x, y)$ para cada x, y en X .

Ejercicio 6. 5 %.

Consideramos \mathbb{Z} con la distancia canónica $d(x, y) := |x - y|$. Sea $A \subseteq \mathbb{Z}$. Demostrar que A es **acotado** si, y sólo si, A es finito.

Ejercicio 7. 6 %.

Consideramos \mathbb{Z} como subconjunto del espacio métrico \mathbb{R} . Demostrar que \mathbb{Z} no es acotado.

Ejercicio 8. 5 %.

Ejemplo de una función acotada. Demostrar que la siguiente función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada:

$$f(t) := \frac{t}{t^2 + 1}.$$

Ejercicio 9. 7 %.

Pasar de una función con límite a una función no acotada. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $7 \notin f[\mathbb{R}]$, pero $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$. Demostrar que la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida mediante la siguiente regla, no es acotada.

$$g(x) := \frac{1}{f(x) - 7}.$$

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := \frac{2 + (-1)^k}{k}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(m) := \sup_{j, k \geq m} |a_j - a_k|.$$

Ejercicio 11. 5 %.

Sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente. Sean (X, d) un espacio métrico, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X , $b \in X$, $\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una sucesión estrictamente creciente, tales que $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{\nu(k)} = b$. Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$.

Ejercicio 12. 5 %.

Criterio de Heine de funciones continuas entre espacios métricos. Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos, $f: X \rightarrow Y$, $a \in X$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre sí:

- (a) f es continua en a ;
- (b) para cada sucesión $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X , si $t_n \rightarrow a$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $f(t_n) \rightarrow f(a)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := e^{-|x|}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \cos(x^3), \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [1, 3], \quad f(x) := -\frac{x^2}{6} + \frac{4}{3}x.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 := 1$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Sea $a > 1$. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [\sqrt{5}, +\infty), \quad f(x) := \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right).$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 := 5$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

Los segmentos de la recta real son espacios métricos totalmente acotados. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Denotamos por X el segmento $[a, b]$ con la distancia inducida de \mathbb{R} . Demostrar de manera directa que X es un espacio métrico totalmente acotado. En otras palabras, para $\varepsilon > 0$ general construir una ε -red finita en X .

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := x^3 - 3x + 5.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 7$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante 0.

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

Los números naturales con una distancia especial. Sea $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$. Definimos $d: \mathbb{N}^2 \rightarrow [0, +\infty)$,

$$d(m, n) := \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right|.$$

I. Demostrar que d es una distancia.

II. Para cada m en \mathbb{N} encontrar $r > 0$ tal que $B_d(m, r) = \{m\}$.

III. Demostrar que la topología τ_d inducida por d es discreta, es decir, $\tau_d = 2^{\mathbb{N}}$.

IV. Demostrar que si una sucesión en (\mathbb{N}, d) converge, entonces es una constante, a partir de cierto índice.

V. Encontrar en (\mathbb{N}, d) una sucesión de Cauchy que no converge.

Ejercicio 2. 5 %.

La frontera de la bola abierta está contenida en la esfera. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $a \in X$, $r > 0$. Demostrar que

$$\text{fr}(B(a, r)) \subseteq S(a, r).$$

Ejercicio 3. 6 %.

La frontera de una bola abierta puede no coincidir con la esfera. Encontrar un espacio métrico (X, d) , un punto a en X y un número $r > 0$ tales que

$$\text{fr}(B(a, r)) \neq S(a, r).$$

Ejercicio 4. 5 %.

Descripción de los conjuntos cerrados en términos de bolas. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por τ_d la topología inducida por d . Sea $Y \subseteq X$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre sí:

(a) $X \setminus Y \in \tau_d$;

(b) $\forall x \in X \left((\forall r > 0 \ B(x, r) \cap Y \neq \emptyset) \Rightarrow x \in Y \right)$.

Ejercicio 5. 5 %.

Separación de dos conjuntos en espacios métricos por medio de una función continua.

Sea (X, d) un espacio métrico y sean $P, Q \subseteq X$ tales que

$$P \neq \emptyset, \quad Q \neq \emptyset, \quad d(P, Q) > 0.$$

Construir $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 0$ para cada x en P y $f(x) = 1$ para cada y en Q .

Ejercicio 6. 5 %.

Criterio de conjuntos acotados en espacios normados. Sea V un espacio normado y sea $A \subseteq V$.

Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes.

(a) $\text{diam}(A) < +\infty$;

(b) existe $R > 0$ tal que $A \subseteq B(0_V, R)$.

Ejercicio 7. 6 %.

En los espacios normados, los subespacios no triviales no son acotados. Sea V un espacio normado y sea W un subespacio de V tal que $W \neq \{0_V\}$. Demostrar que W es un conjunto no acotado.

Ejercicio 8. 5 %.

Ejemplo de una función acotada. Demostrar que la siguiente función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada:

$$f(x, y) := \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1}.$$

Ejercicio 9. 7 %.

Cada función convexa no constante es no acotada. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa no constante. Demostrar que $\sup(f[\mathbb{R}]) = +\infty$.

Sugerencias. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $a < b < c$ y $f(a) \neq f(c)$. Aplicar la definición de función convexa y mostrar que $f(a) > f(b)$ o $f(c) > f(b)$. En el primer caso, para cada $t < a$ aplicar la definición de función convexa con los puntos t, a, b .

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := 5 + \cos \frac{k\pi}{2}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(m) := \sup_{j, k \geq m} |a_j - a_k|.$$

Sugerencia: para empezar, se recomienda calcular a_k para los casos $k \in 4\mathbb{N}$, $k \in 4\mathbb{N} - 3$, $k \in 4\mathbb{N} - 2$, $k \in 4\mathbb{N} - 1$.

Ejercicio 11. 5 %.

Cada sucesión de Cauchy contiene una subsucesión regular de Cauchy. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X . Demostrar que existe una sucesión estrictamente creciente $\nu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $d(a_{\nu(k)}, a_{\nu(k+1)}) \leq 2^{-k-1}$ para cada k en \mathbb{N} .

Ejercicio 12. 5 %.

Criterio de funciones continuas en términos de las cerraduras. Sean X, Y espacios topológicos y sea $f: X \rightarrow Y$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre si:

- (a) f es continua;
- (b) para $A \subseteq X$, $f[\text{cl}_X(A)] \subseteq \text{cl}_Y(f[A])$.

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x}{x^2 + 1}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := x^3, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [-2, 0], \quad f(x) := -\frac{x^2 + 4}{5}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 := -2$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [\sqrt[3]{7}, +\infty), \quad f(x) := \frac{2}{3} + \frac{7}{2x^2}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 := 7$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

El cubo unitario en \mathbb{R}^n es un espacio métrico totalmente acotado. En el espacio \mathbb{R}^n con la distancia euclidiana consideramos el subespacio $X := [0, 1]^n$. Demostrar de manera directa que X es un espacio métrico totalmente acotado. En otras palabras, para $\varepsilon > 0$ general construir una ε -red finita en X .

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := x^3 - 3x + 5.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 7$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante 1.

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

Subespacios métricos. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $Y \subseteq X$. Denotemos $d|_{Y \times Y}$ por ρ .

- I. Demostrar que (Y, ρ) es un espacio métrico.
- II. Demostrar que si $A \in \tau_d$, entonces $A \cap Y \in \tau_\rho$.
- III. Demostrar que si $Q \in \tau_\rho$, entonces existe $A \in \tau_d$ tal que $Q = A \cap Y$.
- IV. Usando los resultados de los incisos II y III, describir τ_ρ en términos de τ_d .
- V. En el espacio $X = \mathbb{R}$ con la métrica usual d construir Y y Q tales que $Q \in \tau_\rho$, pero $Q \notin \tau_d$.

Ejercicio 2. 5 %.

La intersección de dos bolas abiertas es vacía, si la distancia entre sus centros es mayor o igual a la suma de los radios. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $a_1, a_2 \in X$, $r_1, r_2 > 0$. Supongamos que $d(a_1, a_2) \geq r_1 + r_2$. Demostrar que

$$B(a_1, r_1) \cap B(a_2, r_2) = \emptyset.$$

Ejercicio 3. 6 %.

La intersección de dos bolas puede ser vacía, aunque la distancia entre los centros es menor que la suma de los radios. Encontrar un subespacio métrico X del espacio \mathbb{R}^2 , dos puntos a_1, a_2 en X y dos números $r_1, r_2 > 0$ tales que

$$d(a_1, a_2) < r_1 + r_2, \quad B(a_1, r_1) \cap B(a_2, r_2) = \emptyset.$$

Ejercicio 4. 5 %.

Las bolas cerradas son cerradas. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por τ_d la topología inducida por d . Sean $a \in X$, $r > 0$. Demostrar que

$$X \setminus C(a, r) \in \tau_d,$$

donde $C(a, r) := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}$.

Ejercicio 5. 5 %.

Descripción de la cerradura del conjunto en el espacio métrico por medio de sus vecindades uniformes. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $Y \subseteq X$. Demostrar que

$$\text{cl}(Y) = \{x \in X: D_Y(x) = 0\} = \bigcap_{\varepsilon > 0} V(Y, \varepsilon),$$

donde

$$V(Y, \varepsilon) := \{x \in X: D_Y(x) < \varepsilon\}, \quad D_Y(x) := \inf_{y \in Y} d(x, y).$$

Ejercicio 6. 5 %.

Una cota superior para el diámetro de la unión de un conjunto acotado con un conjunto unipuntual. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subseteq X$ tal que $\text{diam}(A) < +\infty$. Sea $b \in X$. Pongamos $C := A \cup \{b\}$. Demostrar que

$$\text{diam}(C) \leq \text{diam}(A) + d(b, A).$$

Hacer un dibujo que ayude a entender la idea de la parte principal de la demostración. Indicación: hay que resolver este ejercicio de manera directa; no está permitido usar resultados más generales sobre el diámetro de la unión de dos conjuntos.

Ejercicio 7. 6 %.

El intervalo $(-1, 1)$ con una distancia no canónica no es espacio acotado. Sea $X = (-1, 1)$. Definimos $\rho: X \rightarrow [0, +\infty)$,

$$\rho(x, y) := \left| \tan \frac{\pi x}{2} - \tan \frac{\pi y}{2} \right|.$$

Verificar que (X, ρ) es un espacio métrico. Mostrar que este espacio no es acotado.

Ejercicio 8. 5 %.

Las funciones polinomiales son acotadas en los intervalos acotados. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una función polinomial:

$$f(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k,$$

donde $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$. Demostrar de manera explícita que f es acotada, es decir, encontrar una superior explícita para los valores de $|f|$.

Ejercicio 9. 7 %.

Cada polinomio no constante es una función no acotada. Sea $m \in \mathbb{N}$ y sean $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$. Supongamos que $a_m \neq 0$. Definimos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \sum_{k=0}^m a_k x^k.$$

Demostrar que f no es acotada.

Sugerencia: factorizar $|x^m|$ y analizar el comportamiento de $f(x)$, cuando $|x|$ es grande.

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := 2 \cdot (-1)^k + \frac{1}{k}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(m) := \sup_{j, k \geq m} |a_j - a_k|.$$

Sugerencia: para empezar, se recomienda calcular a_k para los casos $k \in 2\mathbb{N}$ y $k \in 2\mathbb{N} - 1$.

Ejercicio 11. 5 %.

Una función continua que no preserva sucesiones de Cauchy. Encontrar espacios métricos (X, d_X) , (Y, d_Y) , una función continua $f: X \rightarrow Y$ y una sucesión de Cauchy $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X tales que la sucesión $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ no sea de Cauchy.

Ejercicio 12. 5 %.

La continuidad no se describe fácilmente en términos de los interiores y las imágenes. Encontrar espacios topológicos X, Y , una función continua e inyectiva $f: X \rightarrow Y$ y un conjunto $A \subseteq X$ tales que

$$\text{int}_Y(f[A]) \not\subseteq f[\text{int}_X(A)].$$

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x}{|x| + 3}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := (0, +\infty), \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [0, 2], \quad f(x) := \frac{x^2}{3} - \frac{x}{3} + 1.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 := 2$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [0, 2], \quad f(x) := \frac{\cos(x) + 2}{3}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 = 1$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

Cada espacio métrico totalmente acotado es separable. Sea (X, d) un espacio métrico totalmente acotado. Demostrar que este espacio es separable.

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := -x^3 + 2x - 4.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 17$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante 2.

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

Ejemplo de espacio métrico: un país con vuelos a través de la capital. Definimos $\rho: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$ mediante la siguiente regla:

$$\rho(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := \begin{cases} |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|, & \mathbf{a} \neq \mathbf{b}; \\ 0, & \mathbf{a} = \mathbf{b}. \end{cases}$$

I. Demostrar que (\mathbb{R}, ρ) es un espacio métrico.

II. Dado $r > 0$, calcular $B_\rho(0, r)$.

III. Dados $\mathbf{a} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $r > 0$, calcular $B_\rho(\mathbf{a}, r)$. Considerar los casos $r \leq |\mathbf{a}|$ y $r > |\mathbf{a}|$.

Ejercicio 2. 5 %.

Una condición suficiente para la contención de las bolas. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in X$, $r_1, r_2 > 0$. Supongamos que $d(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) + r_1 \leq r_2$. Demostrar que

$$B(\mathbf{a}_1, r_1) \subseteq B(\mathbf{a}_2, r_2).$$

Ejercicio 3. 6 %.

Una bola de radio mayor puede ser subconjunto propio de una bola de radio menor. Consideramos el subespacio métrico $X = [0, +\infty)^2$ del espacio \mathbb{R}^2 . Encontrar dos puntos $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ en X y dos números $r_1, r_2 > 0$ tales que

$$r_1 < r_2, \quad B(\mathbf{a}_2, r_2) \subsetneq B(\mathbf{a}_1, r_1).$$

Ejercicio 4. 5 %.

La topología del espacio métrico es de Hausdorff. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por τ_d la topología inducida por d . Sean $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in X$. Construir $P, Q \in \tau_d$ tales que

$$\mathbf{a}_1 \in P, \quad \mathbf{a}_2 \in Q, \quad P \cap Q = \emptyset.$$

Ejercicio 5. 5 %.

Descripción del interior del conjunto en el espacio métrico por medio de su distancia al complemento. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $Y \subseteq X$. Demostrar que

$$\text{int}_d(Y) = \left\{ x \in X : D_{X \setminus Y}(x) > 0 \right\},$$

donde $D_A(x) := \inf_{a \in A} d(x, a)$.

Ejercicio 6. 5 %.

Las envolturas convexas de los conjuntos acotados son conjuntos acotados. Sea V un espacio normado complejo y sea $A \subseteq V$ tal que A es acotado. Demostrar que $\text{conv}(A)$ es acotado. Se recomienda usar el criterio de conjuntos acotados en espacios normados.

Ejercicio 7. 6 %.

Criterio de subconjunto no acotado en \mathbb{R} . Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes:

- (a) $\text{diam}(A) = +\infty$;
- (b) $\inf(A) = -\infty$ o $\sup(A) = +\infty$.

Ejercicio 8. 5 %.

Ejemplo de una función acotada. Demostrar que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida mediante la siguiente regla, es acotada:

$$f(x) = \frac{(x^2 - 1) \sin(x^2)}{x^4 + 5 - \cos(\sqrt[3]{x})}.$$

Ejercicio 9. 7 %.

Ejemplo de función no acotada que no tiende al infinito. Construir una función $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ que tenga todas las siguientes propiedades.

- A. f es continuamente derivable.
- B. f es no acotada.
- C. No es cierto que $f(t) \rightarrow +\infty$, cuando $t \rightarrow +\infty$.

Se recomienda construir f usar alguna función potencial, alguna función trigonométrica y operaciones aritméticas.

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := \sqrt{k}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(\mathbf{m}) := \sup_{j, k \geq \mathbf{m}} |a_j - a_k|.$$

Ejercicio 11. 5 %.

La imagen de la sucesión de Cauchy respecto a la función uniformemente continua es una sucesión de Cauchy. Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X , $f: X \rightarrow Y$ una función uniformemente continua. Demostrar que $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en Y .

Ejercicio 12. 5 %.

Criterio de continuidad en términos de las cerraduras y las preimágenes. Sean X, Y espacios topológicos y sea $f: X \rightarrow Y$ y sea $f: X \rightarrow Y$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre sí:

- (a) f es continua;
- (b) para cada $G \subseteq Y$ se cumple que $\text{cl}_X(f^{-1}[G]) \subseteq f^{-1}[\text{cl}_Y(G)]$.

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \sin(\sqrt{|x|}), \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{x^4 + 1}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [2, 4], \quad f(x) := \frac{-x^2 + 6x + 3}{4}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 = 2$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [0, 2], \quad f(x) := \frac{2^x + 1}{5}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 = 1$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

La propiedad de ser totalmente acotado es hereditaria. Sea (X, d) un espacio métrico totalmente acotado y sea $Y \subseteq X$. Consideramos Y como subespacio del espacio métrico X . Demostrar de manera directa que Y es totalmente acotado.

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := 2x^3 - 3x^2 - 7.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -12$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante 3.

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

La distancia de Hamming. Sea A un conjunto y sea $n \in \mathbb{N}$. Pongamos $X := A^n$. Definimos $\rho: X^2 \rightarrow [0, +\infty)$,

$$\rho(x, y) := \#\{j \in \{1, \dots, n\}: x_j \neq y_j\}.$$

I. Demostrar que (X, ρ) es un espacio métrico.

II. Dado x en X , encontrar $r > 0$ tal que $B_\rho(x, r) = \{x\}$.

III. Demostrar que la topología τ_ρ inducida por ρ es discreta, es decir, $\tau_\rho = 2^X$.

Ejercicio 2. 5 %.

La bola abierta está contenida en el interior de la bola cerrada del mismo radio. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $a \in X$, $r > 0$. Demostrar que

$$B(a, r) \subseteq \text{int}(C(a, r)),$$

donde $C(a, r) := \{x \in X: d(x, a) \leq r\}$.

Ejercicio 3. 6 %.

El interior de una bola cerrada puede no coincidir con la bola abierta del mismo radio.

Encontrar un espacio métrico (X, d) , un punto a en X y un número $r > 0$ tales que

$$B(a, r) \neq \text{int}(\overline{B}(a, r)).$$

Ejercicio 4. 5 %.

El interior topológico y el interior métrico. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por τ_d la topología inducida por d . Sea $Y \subseteq X$. Demostrar que $\text{int}_d(Y) = \text{int}_{\tau_d}(Y)$, donde

$$\begin{aligned} \text{int}_d(Y) &:= \{x \in X: \exists r > 0 \quad B(x, r) \subseteq Y\}, \\ \text{int}_{\tau_d}(Y) &:= \{x \in X: \exists A \in \tau_d \quad x \in A \quad \wedge \quad A \subseteq Y\}. \end{aligned}$$

Ejercicio 5. 5 %.

La “semidistancia de Hausdorff” entre los subconjuntos no vacíos del espacio métrico. Sea (X, d) un espacio métrico. Denotemos por \mathcal{S} al conjunto de todos los subconjuntos no vacíos de X . Para cada P, Q en \mathcal{S} , pongamos

$$h(P, Q) := \sup_{p \in P} D_Q(p), \quad \text{donde} \quad D_Q(p) := \inf_{q \in Q} d(p, q).$$

Demostrar que para cada P, Q, R en \mathcal{S} se cumple la desigualdad

$$h(P, R) \leq h(P, Q) + h(Q, R).$$

Ejercicio 6. 5 %.

El diámetro de la cerradura del conjunto coincide con el diámetro del conjunto original. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subseteq X$. Demostrar que

$$\text{diam}(\text{cl}(A)) = \text{diam}(A).$$

Ejercicio 7. 6 %.

Conjunto no acotado y sucesiones. Sea (X, d) un espacio métrico y sea Y un subconjunto de X no acotado. Además, sea $a \in X$. Demostrar que existe una sucesión $(y_k)_{k \in \mathbb{N}} \in Y^{\mathbb{N}}$ tal que $d(y_k, a) \geq k$ para cada k en \mathbb{N} .

Ejercicio 8. 5 %.

Ejemplo de una función racional acotada. Sean P, Q polinomios de una variable con coeficientes complejos tales que $\deg(P) \leq \deg(Q)$. Supongamos que Q no tiene ceros en \mathbb{R} . Definimos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(t) := \frac{P(t)}{Q(t)}.$$

Demostrar que f es acotada.

Ejercicio 9. 7 %.

Ejemplo de función que tiende al infinito, pero no es creciente. Construir una función $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ que tenga todas las siguientes propiedades.

- A. f es continuamente derivable.
- B. $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$.
- C. f no es creciente (en el sentido no estricto) en cada rayo:

$$\forall s > 0 \quad \exists t, u \quad \left(s < t < u \quad \wedge \quad f(t) > f(u) \right).$$

Se recomienda construir f usar polinomios de grado pequeño y alguna función trigonométrica, y combinarlas con operaciones aritméticas.

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := 2 \cos \frac{2k\pi}{3}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(m) := \sup_{j, k \geq m} |a_j - a_k|.$$

Sugerencia: para empezar, se recomienda calcular a_k para los casos $k \in 3\mathbb{N}$, $k \in 3\mathbb{N} - 2$, $k \in 3\mathbb{N} - 1$.

Ejercicio 11. 5 %.

La pseudodistancia natural entre las sucesiones de Cauchy. Sea (X, d) un espacio métrico.

I. Sean $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $\mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones de Cauchy en X . Demostrar que $(d(a_n, b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $[0, +\infty)$.

II. Denotemos por $S(X)$ al conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en X . Definimos $\rho: S(X)^2 \rightarrow [0, +\infty)$,

$$\rho(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n).$$

Demostrar que ρ es una pseudodistancia en $S(X)$.

Ejercicio 12. 5 %.

Criterio de continuidad en términos de las cerraduras y las imágenes. Sean X, Y espacios topológicos y sea $f: X \rightarrow Y$ y sea $f: X \rightarrow Y$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre sí:

- (a) f es continua;
- (b) para cada $A \subseteq X$ se cumple que $f[\text{cl}_X(A)] \subseteq \text{cl}_Y(f[A])$.

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{|x| + 1}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := (0, +\infty), \quad f(x) := \text{sen} \frac{1}{x}, \quad \omega_f(\delta) := \sup \left\{ |f(x) - f(y)| : x, y \in X, |x - y| \leq \delta \right\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [2, 4], \quad f(x) := -\frac{x^2}{3} + 2x.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 = 4$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [0, 3], \quad f(x) := \frac{\sin(x) + 3}{2}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 = 3$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

Los espacios totalmente acotados son acotados. Sea (X, d) un espacio métrico totalmente acotado. Demostrar que $\text{diam}(X) < +\infty$.

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := x^3 + x^2 - 2x.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -12$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .

Análisis Matemático IV. Tarea “Espacios métricos”.

Variante 4.

Ejemplos de espacios métricos, bolas en espacios métricos, la topología del espacio métrico, la distancia entre puntos y conjuntos en espacios métricos, conjuntos acotados en espacios métricos, funciones acotadas, sucesiones de Cauchy, funciones uniformemente continuas, funciones contractivas, espacios métricos totalmente acotados.

Ejercicio 1. 5 %.

Una receta para construir una distancia usando una distancia dada y una función cóncava.

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\eta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una función cóncava, esto es, para cada t, u en $[0, +\infty)$ y cada λ en $[0, 1]$,

$$\eta((1 - \lambda)t + \lambda u) \geq (1 - \lambda)\eta(t) + \lambda\eta(u).$$

Además, suponemos que η es estrictamente creciente y $\eta(0) = 0$. Definimos $\rho: X^2 \rightarrow [0, +\infty)$ mediante la siguiente regla:

$$\rho(x, y) := \eta(d(x, y)).$$

Demostrar que ρ es una distancia.

Ejercicio 2. 5 %.

La intersección de dos bolas abiertas es vacía, si la distancia entre sus centros es mayor o igual a la suma de los radios. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $a_1, a_2 \in X$, $r_1, r_2 > 0$. Supongamos que $d(a_1, a_2) \geq r_1 + r_2$. Demostrar que

$$B(a_1, r_1) \cap B(a_2, r_2) = \emptyset.$$

Ejercicio 3. 6 %.

La intersección de dos bolas puede ser vacía, aunque la distancia entre los centros es menor que la suma de los radios. Consideramos el espacio \mathbb{Z} con la distancia

$$d(x, y) := \begin{cases} |x| + |y|, & x \neq y; \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

Verificar que se cumple la desigualdad del triángulo. Encontrar dos puntos a_1, a_2 en X y dos números $r_1, r_2 > 0$ tales que

$$d(a_1, a_2) < r_1 + r_2, \quad B(a_1, r_1) \cap B(a_2, r_2) = \emptyset.$$

Ejercicio 4. 5 %.

Una descripción de la frontera en términos de bolas. Sea (X, d) un espacio métrico. Sea $Y \subseteq X$. Demostrar que $P = Q$, donde

$$P = X \setminus (\text{int}_d(Y) \cup \text{int}_d(X \setminus Y)),$$
$$Q = \left\{ x \in X : \forall r > 0 \quad (B(x, r) \cap Y \neq \emptyset \quad \wedge \quad B(x, r) \setminus Y \neq \emptyset) \right\}.$$

Ejercicio 5. 5 %.

Ejemplo, cuando para la distancia-ínfimo entre los conjuntos no se cumple la desigualdad del triángulo. Dado un espacio métrico (X, d) , denotamos por $\mathcal{P}_1(X)$ al conjunto de los subconjuntos no vacíos de X y definimos $F: \mathcal{P}_1(X)^2 \rightarrow [0, +\infty)$ mediante la regla

$$F(A, B) := \inf_{\substack{a \in A \\ b \in B}} d(a, b).$$

Encontrar un espacio métrico (X, d) y conjuntos $A, B, C \in \mathcal{P}_1(X)$ tales que

$$F(A, B) > F(A, C) + F(C, B).$$

Ejercicio 6. 5 %.

En los espacios normados, la suma de dos conjuntos acotados es un conjunto acotado. Sea V un espacio normado y sean $P, Q \subseteq V$ conjuntos acotados. Demostrar que $P + Q$ es un conjunto acotado.

Ejercicio 7. 6 %.

Espacio métrico no acotado y dos subconjuntos no acotados. Sean (X, d) un espacio métrico no acotado.

I. Mostrar que existe $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $d(a_{k+1}, \{a_1, \dots, a_k\}) \geq k$ para cada k en \mathbb{N} ;

II. Encontrar dos conjuntos $Y, Z \subseteq X$ no acotados tales que $Y \cap Z = \emptyset$.

Ejercicio 8. 5 %.

Ejemplo de una función acotada.

I. Demostrar que si $x, y > 0$, entonces $x^2 - xy + y^2 > 0$.

II. Sea $f: (0, +\infty)^2 \rightarrow (0, +\infty)$,

$$f(x, y) := \frac{xy}{x^2 - xy + y^2}.$$

Demostrar que f es acotada.

Ejercicio 9. 7 %.

La suma de dos funciones no acotadas puede ser acotada. Construir dos funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no acotadas tales que $f + g$ sea acotada. Demostrar bien que f y g son no acotadas.

Ejercicio 10. 5 %.

Cálculo del medidor de Cauchy. Dada una sucesión $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, calcular su “medidor de Cauchy” $\gamma_{\mathbf{a}}$ y determinar si \mathbf{a} es de Cauchy.

$$a_k := 3 \cdot (-1)^k + \frac{1}{k}, \quad \gamma_{\mathbf{a}}(m) := \sup_{j, k \geq m} |a_j - a_k|.$$

Ejercicio 11. 5 %.

Cada sucesión regular de Cauchy es una sucesión de Cauchy. Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathbf{a} = (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ una sucesión regular de Cauchy, esto es,

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad d(a_k, a_{k+1}) < 2^{-k-1}.$$

Acotar de manera adecuada el medidor de Cauchy de la sucesión \mathbf{a} y demostrar que \mathbf{a} es de Cauchy.

Ejercicio 12. 5 %.

Criterio de continuidad en términos de bases de topologías. Sean X, Y espacios topológicos, \mathcal{A} una base de topología de X \mathcal{B} una base de topología de Y , $f: X \rightarrow Y$. Demostrar que las siguientes dos condiciones son equivalentes entre si:

- (a) f es continua;
- (b) para cada Q en \mathcal{B} existe P en \mathcal{A} tal que $f[P] \subseteq Q$.

Ejercicio 13. 5 %.

Ejemplo de función uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f es uniformemente continua.

$$X := \mathbb{R}, \quad f(x) := x e^{-|x|}, \quad \omega_f(\delta) := \sup\{|f(x) - f(y)|: x, y \in X, |x - y| \leq \delta\}.$$

Ejercicio 14. 8 %.

Ejemplo de función que no es uniformemente continua. Para la función dada $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ calcular o acotar bien por abajo su medidor de continuidad uniforme ω_f y demostrar que f no es uniformemente continua.

$$X := (0, +\infty), \quad f(x) := \operatorname{sen}(x^2), \quad \omega_f(\delta) := \sup\{|f(x) - f(y)|: x, y \in X, |x - y| \leq \delta\}.$$

Ejercicio 15. 5 %.

Ejemplo simple de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [3, 5], \quad f(x) := \frac{-x^2 + 8x + 4}{5}.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. Encontrar p en X tal que $f(p) = p$. En este ejemplo es suficiente adivinar p y comprobar que $f(p) = p$.

IV. Sea $x_0 = 3$. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 16. 7 %.

Ejemplo de función contractiva. Ejemplo de función contractiva. Consideremos la función f definida en el conjunto X mediante la siguiente regla.

$$X := [\pi, 2\pi], \quad f(x) := \arctan(x) + \pi.$$

I. Demostrar que $f(x) \in X$ para cada x en X .

II. Calcular o acotar de manera apropiada los números $M_1 := \inf_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$, $M_2 := \sup_{x \in \text{int}(X)} f'(x)$,

$$M := \sup_{x \in \text{int}(X)} |f'(x)|.$$

III. En algún lenguaje de programación programar el algoritmo de iteración simple (conocido también como el método del punto fijo) y con ese programa calcular p en X tal que $f(p) = p$. Se recomienda empezar con $x_0 = \pi$.

IV. Calcular $x_1 := f(x_0)$, $x_2 := f(x_1)$. Calcular los cocientes

$$q_1 := \frac{|x_1 - p|}{|x_0 - p|}, \quad q_2 := \frac{|x_2 - p|}{|x_1 - p|}.$$

Ejercicio 17. 5 %.

Los espacios totalmente acotados. Sea (X, d) un espacio métrico y sean P, Q subespacios métricos de X totalmente acotados. Demostrar que $P \cup Q$ es totalmente acotado.

Ejercicio 18. 5 %.

Ejemplo de demostración del límite por definición. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := -x^3 + 2x^2 - 5.$$

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 11$ trabajando directamente con la definición del límite, en el lenguaje de ε y δ .